Alerte à la syphilis

D'après et avec l'aimable autorisation de l'association **Act Up Paris** / **http://www.actupparis.org/article239.html**

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA SYPHILIS ?

- Le premier signe est l'apparition d'une **petite plaie indolore** (le chancre syphilitique) à l'endroit de la contamination **8 à 21 jours après le rapport sexuel.** Ce chancre s'accompagne souvent de ganglions à l'aine. En phase primaire, les symptômes de la syphilis sont des ulcérations de la peau ou des muqueuses (gland, bouche, anus). Elles sont cependant indolores et disparaissent spontanément. Elles peuvent cependant avoir de nombreux autres aspects, aussi **toute ulcération génitale doit vous faire consulter un médecin**. Enfin, **un chancre peut passer aussi inaperçu** (lorsqu'il est situé dans la bouche ou dans l'anus).
- La bactérie responsable de la syphilis, le **tréponème**, s'installe ensuite dans tout le corps, **dans les 1 mois et demi à 3 mois après le rapport contaminant**. La phase secondaire de la maladie débute alors, avec des éruptions cutanées (surtout), des fièvres, des douleurs articulaires, des dermites séborrhéiques du visage, mais il peut n'y avoir aussi aucun symptôme. La bactérie est présente dans tous les fluides corporels, et **les lésions deviennent très contagieuses.**
- **Non traitée,** la syphilis peut entraîner un **accident vasculaire cérébral, une méningite** et laisser des séquelles importantes (surdité, cécité, etc.). Une progression vers une atteinte grave du système nerveux est alors possible.

COMMENT SE TRANSMET LA SYPHILIS ?

- La syphilis se transmet par le **contact direct des muqueuses pendant un rapport sexuel** et par échange de fluides corporels. À mesure que la maladie progresse, le risque de contaminer de nouveaux partenaires s'accroît.
- La syphilis augmente aussi les risques de **contamination par le virus du sida**.

CETTE ÉPIDÉMIE PEUT FACILEMENT ÊTRE ENRAYÉE

- **Pratiquez régulièrement un test de dépistage sanguin**, surtout en cas de rapports sexuels fréquents avec des partenaires occasionnels.
- **Plus tôt vous êtes dépisté,** plus vite la syphilis peut être traitée et guérie. Diagnostiquée au début de l'infection, elle se soigne simplement par des injections intramusculaires de pénicilline. Informez vos partenaires pour qu'ils se traitent rapidement.
- **Mettez un préservatif** pour chaque fellation et chaque pénétration.

Protégez-vous, protégez vos partenaires